

الانزعاج من الحرائق: الألم

من الطبيعي أن تشعر ببعض الألم أثناء الشفاء من الحرائق. إذا لم يكن طفلك في حالته الطبيعية أو لا يلعب كثيراً أو كان متوتراً ويصعب تهدئته، فقد يكون حرقه مؤلماً.

تحفيض الألم

إذا كان الطفل يعاني من الألم، اعطه الباراسيتامول (بانادول®) أو الإيبوبروفين (نوروفين®) وليس كليهما.

إيبوبروفين (نوروفين)

تم إعطاؤه في:

الجرعة التالية في:

لا تزيد عن 3 مرات في اليوم الواحد

تحقق من التعليمات المكتوبة في العلبة

باراسيتامول (بانادول)

تم إعطاؤه في:

الجرعة التالية في:

الحد الأقصى لا يتجاوز 4 مرات في اليوم الواحد

تحقق من التعليمات المكتوبة في العلبة

يمكنك أيضاً التحدث إلى الصيدلي للحصول على معلومات بشأن تحفيض الألم.

الذهاب إلى عيادة بيرنز (Burns) الخارجية

إذا كان الطفل سبذاً إلى عيادة بيرنز الخارجية (العيادة L) لتغيير الضمادات، فيرجى إعطائه بانادول أو نوروفين قبل 30 دقيقة من موعده. سوف تحتاج جروح الحرائق لدى طفلك إلى العسل والتنظيف وقد يكون هذا مؤلماً.

قبل أن يتم تغيير ضمادة طفلك، أخبر الممرض/ة ما هو الدواء الذي يتناوله طفلك، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير نوع العلاج المطلوب.

إذا كان الطفل متوتراً أو متائماً ولم تنجح مسكنات الألم، فيرجى الاتصال بـ:

- PCH Ward 1B على 3630 6456 أو
- خط معلومات الأدوية التابع لقسم الصيدلة في مستشفى PCH على الرقم 0190 6456 6456 (اضغط الخيار 1)، من نهار الاثنين إلى نهار الجمعة خلال ساعات العمل.

خدمة صحة الطفل والراهقين

15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009.

الهاتف: (08) 6456 2222

صادر عن: وحدة الحرائق / العمل الاجتماعي

المرجع: CAHS 2021 © 581.2



Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

أخلاع المسؤولية: هذا المنشور مخصص لأغراض التعليم العام و على سبيل المعلومات.
اتصل بأخصائي رعاية صحية مؤهل للحصول على أي نصيحة طبية تحتاجها.

© ولاية غرب أستراليا، خدمة صحة الأطفال والراهقين.

يمكن توفير هذه الوثيقة باشكال بدائلية
عند الطلب لشخص من ذوي الإعاقة.