


خطة الإسعافات الأولية لإدارة النوبات

النوبة التشنجية = ارتعاشات غير منضبطة للأطراف والجسم مع تغير مستوى الوعي.

1. لاحظ وقت بداية النوبة ومدتها وخصائصها

2. تقديم الإسعافات الأولية

- حافظ على الهدوء
- قم بإزالة الأشياء التي يمكن أن تسبب الأذى ولا تقم بإدخال الأصابع/الأشياء في فم الطفل
- لا تحاول تقييد حركات الطفل
- إذا كان الطفل على الأرض، ضع شيئاً ناعماً تحت رأسه، قم بفك أي شيء مشدود حول رقبته
- إذا كان الطفل مستلقياً، فبمجرد توقف النوبات، قم بقلب الطفل على جانبه (أي وضع التعافي) إذا كنت قادرًا على القيام بذلك، حتى يصبح مستعداً للجلوس بنفسه أو وصول المساعدة
- ابق مع الطفل واستمر في مراقبة تنفسه ولونه حتى وصول المساعدة أو تعافي الطفل.
- حاول الحفاظ على الخصوصية وإبعاد الآخرين



3. اتصل على رقم الهاتف: 000 واطلب سيارة إسعاف على الفور

- إذا كان الطفل يعاني من أي صعوبات في التنفس أو أصبح لونه أزرقاً (أزرق حول الوجه / الشفاه) أثناء أو بعد النوبة
- الطفل تعرض لأذى أو مصاب
- حدوث النوبة أثناء وجوده في الماء

4. إذا استمرت النوبة التشنجية لأكثر من دقيقة، يتم إعطاء الميدازولام الموصوف:

| | | |
|--|--|---|
| المسار: | <input type="checkbox"/> فموي | الحقن الأنفي |
| التعليمات: | جرعة الميدازولام ملغ (..... قطرات / مل / أمبولة) | |
| اتصل بالسعاف | <input type="checkbox"/> | قبل / في وقت إعطاء الميدازولام |
| إذا لم تتوقف النوبة خلال دقائق بعد إعطاء الميدازولام آخر:..... | <input type="checkbox"/> | إذا لم تتوقف النوبة خلال دقائق بعد إعطاء الميدازولام آخر:..... |
| التعليمات: | <input type="checkbox"/> | غير موصوفة |
| الجرعة الثانية من الميدازولام | <input type="checkbox"/> | أعط ملغ (..... قطرات / أمبولة) إذا لم تتوقف النوبة بعد دقائق من إعطاء الجرعة الأولى من الميدازولام |
| التعليمات: | <input type="checkbox"/> | في وقت إعطاء الجرعة الثانية من الميدازولام إذا استمرت النوبة بعد دقائق من إعطاء الجرعة الثانية من الميدازولام |
| الجرعة القصوى في 24 ساعة | <input type="checkbox"/> | |

يفضل استخدام أمبولات بلاستيكية تحتوي على 5 ملغ من الميدازولام **5 ملغ في 1 مل** (1 مل يعادل 20 قطرة). تم تصنيف أمبولات الميدازولام أنها مخصصة "للحقن الوريدي البطيء أو العضلي"، ومع ذلك، يمكن إعطاؤها عن طريق الفم والأنف.

ميدازولام الفموي: يمكن إعطاؤه عن طريق عصر القطرات من الأمبولة مباشرة إلى التجويف الفموي (بين اللثة والخد).

يمكن إعطاء الميدازولام عن طريق الأنف باستخدام "رذاذ" حسب توجيهات ممرضة طفالك أو طبيبه أو الصيدلي.

اسم المريض:

تاريخ الميلاد:

توقيع الطبيب:

الاسم بأحرف واضحة

التاريخ:



Government of **Western Australia**
Child and Adolescent Health Service

خدمة صحة الطفل والراهقين
15 شارع المستشفى، بيدلاندز، غرب أستراليا 6009
الهاتف: (08) 6456 4327
 الصادر عن: قسم الأعصاب
 المرجع: CAHS 2023 © 1096.2



إخلاص المسؤولية: هذا المنشور مخصص لأغراض التعليم العام وعلى سبيل المعلومات.
اتصل بأخصائي رعاية صحة مؤهل من أجل الحصول على أي نصيحة طيبة مطلوبة.
© ولاية غرب أستراليا، خدمة صحة الطفل والراهقين

يمكن توفير هذه الوثيقة باشكال بديلة بناءً على طلب شخص من ذوي الإعاقات.