


တက်ခြင်း ရှေးဦးသူနာပြုစုရေး စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

အကြောက်ဆွဲ၍ တက်ခြင်း = သတိလစ်သွားနိုင်သော မထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ခြေလက်အင်္ဂါများနှင့် ခန္ဓာကိုယ်
အကြောဆွဲတုန်ယင်ခြင်း။

1. တက်ခြင်း စတင်သည့်အချိန်၊ ကြာချိန်နှင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို မှတ်သားထားပါ

2. ရှေးဦးသူနာပြုစု ပေးပါ

- စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားပါ
- အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အရာဝတ္ထုများကို ဖယ်ရှားထားပါ။ ကလေး၏ ပါးစပ်ထဲသို့ လက်ချောင်းများ/အရာဝတ္ထုများ ထိုးမထည့်ပါနှင့်
- ကလေး၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းချုပ်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်
- ကလေးက ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဖြစ်ပါက ဦးခေါင်းအောက်တွင် ပျော့အိသောအရာတစ်ခုကို ထားပေးပြီး လည်ပင်းပတ်ပတ်လည်ရှိ တင်းကျပ်နေသောအရာမှန်သမျှကို ဖြေလျှော့ပေးပါ
- ကလေးက ပက်လက်လဲလျောင်းနေပါက တက်ခြင်း ပြီးသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ကလေးကိုယ်တိုင် မထိုင်နိုင်မချင်း သို့မဟုတ် အကူအညီရောက်မလာမချင်း ဖြစ်နိုင်လျှင် ကလေးကို တစောင်းလှဲနေစေပါ (ဆိုလိုသည်မှာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသော အနေအထား)
- အကူအညီ ရောက်မလာမချင်း သို့မဟုတ် ကလေးက ပြန်လည်ကောင်းမွန်မလာမချင်း ကလေးနှင့်အတူ ရှိနေပေးပြီး ကလေး၏ အသက်ရှူပုံနှင့် အရောင်တို့ကို အမြဲမပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာပါ။
- ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ရှိစေရန်နှင့် အခြားသူများ ဝေးဝေးတွင်ရှိနေစေရန် ကြိုးစားပါ



3. လူနာတင်ယာဉ်ခေါ်ရန် 000 သို့ ချက်ချင်း ဖုန်းခေါ်ပါ

- တက်ခြင်းဖြစ်နေစဉ် သို့မဟုတ် တက်ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက် ကလေးက အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းတစ်ခုခု ဖြစ်လာလျှင် သို့မဟုတ် ပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်လာလျှင် (မျက်နှာ/နှုတ်ခမ်းများတစ်ဝိုက်တွင် ပြာခြင်း)
- ကလေးက ထိခိုက်နာကျင်နေသည် သို့မဟုတ် အနာတရဖြစ်နေသည်
- ရေထဲတွင် တက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်

4. အကြောဆွဲ၍တက်ခြင်းက မိနစ်ထက်ကြာ၍ ဆက်ဖြစ်နေလျှင် ညွှန်ကြားထားသော Midazolam ကို တိုက်ကျွေးပါ-

လမ်းကြောင်း-	ခံတွင်း နှာခေါင်း
Midazolam တစ်ခါသောက်ပမာဏ	 mg (..... အစက် / mL / လေလုံဆေးပုလင်း)
ညွှန်ကြားချက်များ-	
လူနာတင်ယာဉ်ခေါ်ပါ	☐ Midazolam ဆေးမတိုက်မီ / ဆေးတိုက်ချိန်တွင် ☐ Midazolam ဆေးပေးပြီးနောက် မိနစ်အတွင်း တက်ခြင်း ရပ်သွားလျှင် ☐ အခြား-.....
ဒုတိယအကြိမ် Midazolam တစ်ခါသောက်ပမာဏ	☐ ညွှန်ကြားမထားပါ ☐ ပထမအကြိမ် Midazolam တစ်ခါသောက်ပမာဏ တိုက်ကျွေးပြီးနောက် မိနစ်အတွင်း တက်ခြင်း ရပ်သွားလျှင် mg (..... အစက် / လေလုံဆေးပုလင်း) ထပ်ပေးပါ
လူနာတင်ယာဉ်ခေါ်ပါ-	☐ ဒုတိယအကြိမ် Midazolam တစ်ခါသောက်ပမာဏ ပေးချိန်တွင် ☐ ဒုတိယအကြိမ် Midazolam တစ်ခါသောက်ပမာဏ ပေးပြီးနောက် မိနစ်အထိ တက်ခြင်း ဆက်ဖြစ်နေလျှင်
ညွှန်ကြားချက်များ-	
24 နာရီအတွင်း အများဆုံး ဆေးပမာဏ/များ	



1 mL တွင် Midazolam **5 mg** ပါဝင်သော ပလတ်စတစ် လေလုံဆေးပုလင်းကို ပို၍ရွေးချယ်သင့်သည် (1mL သည် အစက် 20 နှင့် ညီမျှသည်)။ Midazolam လေလုံဆေးပုလင်းများတွင် 'အနှေး IV သို့မဟုတ် IM ထိုးဆေးအတွက်' ဟူ၍ အညွှန်းတပ်ထားသည်။ သို့သော် ခံတွင်းနှင့် နှာခေါင်း လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်လည်း ပေးနိုင်သည်။

ခံတွင်း Midazolam- လေလုံဆေးပုလင်းမှ ဆေးကို ခံတွင်း (သွားဖုံးနှင့် ပါးကြား) ထဲသို့ ညှစ်၍ အစက်ချခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက် ပေးနိုင်သည်။

သင့်ကလေး၏ သူနာပြု၊ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူက ညွှန်ကြားပေးထားသော 'ဆေးဖျန်းကိရိယာ' ကို အသုံးပြု၍ နှာခေါင်း Midazolam ကို ပေးနိုင်သည်။

လူနာအမည်-

မွေးသက္ကရာဇ်-

ဆရာဝန်၏ လက်မှတ်-

ပုံနှိပ်အမည်-

ရက်စွဲ-



Government of **Western Australia**
Child and Adolescent Health Service

ကလေးနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု

15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009

တယ်လီဖုန်း (08) 6456 4327

စီစဉ်ထုတ်ဝေသူ- အာရုံကြောဆေးပညာဌာန

ရည်ညွှန်း- 1096.3 © CAHS 2023



မသက်ဆိုင်ကြောင်းငြင်းဆိုချက်- ဤထုတ်ဝေမှုသည်

အထွေထွေ အသိပညာပေးခြင်းနှင့်

သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဖြစ်သည်။

ဤစာရွက်စာတမ်းကို မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးအတွက် တောင်းဆိုလာလျှင် အခြားဖော်မက်များဖြင့် ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။