

## ناراحتی سوختگی: درد

احساس کمی درد هنگام بهبود سوختگی طبیعی است. اگر بچه‌ها حالت عادی خود را ندارند یا زیاد بازی نمی‌کنند یا ناراحت هستند و آرام شدن برایشان دشوار است، ممکن است سوختگی آنها را آزار دهد.

### تسکین درد

اگر کودک درد دارد، به او پاراستامول (Panadol®) یا ایبوپروفن (Nurofen®) بدهید و نه هر دو.

#### ایبوپروفن (Nurofen®)

ارائه شده در: \_\_\_\_\_

دوز بعدی در: \_\_\_\_\_

بیش از 3 بار در 1 روز نباشد

دستورالعمل‌های بسته را ببینید

#### پاراستامول (Panadol®)

ارائه شده در: \_\_\_\_\_

دوز بعدی در: \_\_\_\_\_

بیش از 4 بار در 1 روز نباشد

دستورالعمل‌های بسته را ببینید

همچنین می‌توانید در مورد تسکین درد با داروساز خود مشورت کنید.

### مراجعه به کلینیک سرپایی سوختگی

اگر قرار است برای تعویض پانسمان به کلینیک سرپایی سوختگی (کلینیک J) مراجعه کنید، لطفاً 30 دقیقه قبل از قرار ملاقاتشان، به آنها پانادول یا نوروفن بدهید. زخم‌های سوختگی کودک باید شسته و تمیز شوند و این ممکن است دردناک باشد. قبل از تعویض پانسمان کودک، به پرستار بگویید که نوزاد چه دارویی مصرف می‌کند؛ این ممکن است نوع درمان را تغییر دهد.

اگر کودک ناراحت است، درد دارد و داروی مسکن اثر نمی‌کند، لطفاً با شماره زیر تماس بگیرید:

- PCH Ward 1B به شماره 6456 3630 یا
- با خط اطلاعات دارویی داروخانه بیمارستان کودکان پرت به شماره 6456 0190 تماس بگیرید (گزینه 1 را انتخاب کنید)،  
دوشنبه تا جمعه در ساعات اداری.

**Child and Adolescent Health Service**  
15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009.  
تلفن: (08) 6456 2222  
تولید شده توسط: واحد سوختگی / مددکاری اجتماعی  
ارجاع: CAHS 2021 © 581.4



Government of Western Australia  
Child and Adolescent Health Service

سلب مسئولیت: این مطلب صرفاً با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی منتشر شده است.  
برای دریافت هرگونه توصیه پزشکی،  
با یک متخصص واجد شرایط در حوزه سلامت مشورت کنید.

© State of Western Australia, Child and Adolescent Health Service.

این مطلب در صورت درخواست،

می‌تواند برای افراد دارای معلولیت در قالب‌های دیگری ارائه شود.