

ناراحتی سوختگی: درد

احساس کیدون کمی درد زمانیکه یک سوختگی د حال جور شدویه طبیعی است. اگه طفل د خوی عادی خو نیسته یا زیاد بازی نه مونه یا ناراحت است و آرام کیدون شی مشکل است، شاید سوختگی شی اوره اذیت کنه.

دوایی ضد درد

اگر طفل درد دیره، بلده شی پاراسیتامول (پانادول®) یا ایبوپروفین (نیوروفین®) بیدید مگر هر دو شی ره یکجای ندید.

ایبوپروفین (نیوروفین)

دده شده د:

دوز بعدی د:

بیشتر از 3 بار در 1 روز ندید

طریقه استفاده د پشت پاکت ره توغ کید

پاراسیتامول (پانادول)

دده شده د:

دوز بعدی د:

بیشتر از 4 بار در 1 روز ندید

طریقه استفاده د پشت پاکت ره توغ کید

همچنان می تنید قد فارمسست خو در مورد تسکین درد مشوره کنید.

رفتو به کلینیک مریضای سوختگی بیرون از بستر

اگه طفل بلده تبدیل کیدون پانسمان به کلینیک سوختگی بیرون از بستر (کلینیک J) موره، لطفاً 30 دقیقه قبل از ملاقات شی به اونا پانادول یا نیوروفین بدید. زخم های سوختگی طفل باید شسته و پاک کاری شونه و ای ممکنه دردناک باشه. پیش ازیکه پانسمان طفل ره بدل کینه، به پرستار بوگید که طفل از کدم دوایی ها مصرف مونه، ای کار شاید نوع تداوی مورد نیاز ره تغییر بیدیه.

اگه طفل ناراحت است، درد دیره و دوای ضد درد تاثیر ندره، لطفاً به شماره زیر زنگ بزیند:

- وارد 1B شفاخانه اطفال پرت د شماره 6456 3630 یا
- بخش دواخانه شفاخانه اطفال پرت لین مالوماتی دوایی د شماره 6456 0190 (گزینه 1 ره انتخاب کید)، از روز دوشنبه تا جمعه د دوران ساعتی کاری رسمی.

خدمات صحت طفل و نوجوانا
15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009.
تلفون: (08) 64562222
تولید شده توسط: بخش سوختگی / کار اجتماعی
مرجع: CAHS 2021 © 581.5



Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

سلب مسئولیت: ای نشریه فقط بلده مقصدای آموزش عمومی و مالوماتی است. بلده هرگونه توصیه طبی مورد نیاز قد یک شخص مسلکی مراقبت های صحی واجد شرایط تماس بیگرید.

© ایالت استرالیا غربی، خدمات صحی طفل و نوجوانا.

ای سند ره میتیم د شکل های دیگه
د صورت درخواست بلده یک شخص دارای معیوبیت د دسترس قرار بیدیم.