

烧伤不适感：疼痛

在烧伤愈合时感到些许疼痛是正常的。如果孩子的表现和平时不同，或者不怎么玩耍，又或者他们很哭闹且难以安抚，这有可能是烧伤后的疼痛导致的。

缓解疼痛

如果孩子感到疼痛，可以给他们服用扑热息痛 (Panadol®) 或布洛芬 (Nurofen®)，但不要同时服用。

扑热息痛 (Panadol)

服用时间：_____

下次给药时间：_____

一天最多不超过四次

请查看包装上的说明

布洛芬 (Nurofen)

服用时间：_____

下次给药时间：_____

一天最多不超过三次

请查看包装上的说明

您也可以向药剂师咨询有关缓解疼痛的信息。

去烧伤门诊就诊

如果孩子去烧伤门诊 (J 门诊) 换敷料，请在预约时间前30分钟给他们服用**扑热息痛 (Panadol) 或布洛芬 (Nurofen)**。孩子的烧伤部位需要清洗和清洁，这可能会很痛。

在给孩子更换敷料之前，请告知护士孩子正在服用的药物，因为可能因此而选用不同的治疗类型。

如果孩子哭闹、疼痛并且止痛药没有效果，请拨打：

- 6456 3630 致电**PCH (Perth Children's Hospital - 珀斯儿童医院) 1B病房**，或
- 6456 0190 (按选项1) (周一至周五办公时段内) 致电**PCH药房部药物信息热线**。



Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

此文件可以应残障人士的请求，以其他格式提供。

儿童及青少年健康服务机构

15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009.

电话：(08) 6456 2222

撰写者：烧伤科/社会工作部

参考号码：581.7 © CAHS 2021

免责声明：本出版物仅用于普通教育和信息目的。
如需任何医疗建议，请联系有资质的医疗专业人员。

©西澳大利亚州，儿童及青少年健康服务机构。