


癫痫急救管理计划

痉挛性癫痫 = 四肢和身体不自主抽动，伴有意识水平变化。

1. 记录发作的时间、持续时长和特征

2. 实施急救

- 保持冷静
- 移除可能造成伤害的物品，并且请勿将手指/物品放入孩子的口中。
- 不要试图限制孩子的肢体活动。
- 如果孩子倒在地上，请在他们的头下垫一些柔软的物品，并松开任何紧绷在他们颈部周围的物品。
- 如果孩子处于卧姿，一旦癫痫发作停止，应尽可能将孩子转动到侧卧姿势（即恢复体位），直到他们可以自己坐起来或（医疗）帮助到达为止。
- 陪在孩子身边，继续监测他们的呼吸和肤色，直到（医疗）帮助到达或者孩子的状态恢复。
- 尽量提供隐私空间，并让其他人远离。



3. 立即拨打000，呼叫救护车

- 如果孩子在癫痫发作期间或之后出现呼吸困难或肤色发青（面部/嘴唇出现青紫色）
- 孩子受伤了
- 癫痫在水中发作

4. 如果痉挛性癫痫发作持续超过.....分钟，请给予处方药物咪达唑仑（midazolam）：

途径:	<input type="checkbox"/> 口腔 <input type="checkbox"/> 鼻腔
咪达唑仑的剂量 毫克 (..... 滴 / 毫升 / 安瓿)
指导建议：	
呼叫救护车	<input type="checkbox"/> 在给予咪达唑仑之前或之时 <input type="checkbox"/> 如果在给予咪达唑仑后的.....分钟内癫痫发作未停止 <input type="checkbox"/> 其他：.....
第二剂咪达唑仑的剂量	<input type="checkbox"/> 未开处方 <input type="checkbox"/> 如果在首次给予咪达唑仑后的.....分钟内癫痫发作未停止，则再给予.....毫克 (.....滴/安瓿)。
呼叫救护车：	<input type="checkbox"/> 在给予第二剂咪达唑仑时 <input type="checkbox"/> 如果在给予第二剂咪达唑仑后的.....分钟内癫痫发作仍持续
指导建议：	
24小时内的最大剂量	

每毫升含有5毫克的塑料安瓿瓶米达唑仑为更好的选择（1毫升相当于20滴）。米达唑仑安瓿瓶标签标注为“用于缓慢静脉或肌肉注射”，但是也可以通过口腔和鼻腔给药。

口腔咪达唑仑给药：可以将安瓿瓶中的滴剂直接挤入口腔中（在牙龈和面颊之间）。

鼻腔咪达唑仑给药：可以根据您孩子的护士、医生或药剂师的指示，通过“喷雾器”进行给药。

患者姓名：

出生日期：

医生签名：

书写姓名：

日期：



Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

儿童及青少年健康服务机构

15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009

电话 : (08) 6456 4327

撰写者 : 神经科

参考号码 : 1096.7 © CAHS 2023

此文件可以应残障人士的请求，以其他格式提供。



免责声明：本出版物仅用于普通教育和信息目的。如需任何医疗建议，请联系有资质的医疗专业人员。
©西澳大利亚州，
儿童及青少年健康服务机构

Perth Children's Hospital and Neonatology | Community Health | Mental Health

