

Khó chịu do phỏng/bỏng: đau

Cảm giác đau một chút là bình thường khi phỏng/bỏng đang lành. Nếu trẻ không như bình thường hoặc không chơi nhiều hoặc trẻ quấy khóc và khó dỗ yên, phỏng/bỏng có thể đang làm trẻ đau.

Giảm đau

Nếu trẻ bị đau, hãy sử dụng paracetamol (Panadol®) **hoặc** ibuprofen (Nurofen®) **không dùng cả hai**.

Paracetamol (Panadol)

Được cho lúc: _____

Liều kế tiếp lúc: _____

Không quá 4 lần trong 1 ngày

Hãy xem hướng dẫn ở hộp thuốc

Ibuprofen (Nurofen)

Được cho lúc: _____

Liều kế tiếp lúc: _____

Không quá 3 lần trong 1 ngày

Hãy xem hướng dẫn ở hộp thuốc

Quý vị cũng có thể **nói chuyện với dược sĩ của quý vị** về việc giảm đau.

Đi đến Phòng khám Ngoại trú Phỏng/Bỏng

Nếu trẻ sẽ đến Phòng khám Ngoại trú Phỏng/Bỏng (Phòng khám J) để thay băng, xin vui lòng cho trẻ uống **Panadol hoặc Nurofen 30 phút trước** cuộc hẹn của trẻ. Những vết thương phỏng/bỏng của trẻ sẽ cần phải được rửa và làm sạch và việc này có thể đau đớn.

Trước khi trẻ được thay băng, hãy cho y tá biết thuốc trẻ đang dùng, thuốc có thể thay đổi loại điều trị cần thiết.

Nếu trẻ quấy khóc, bị đau và giảm đau không hiệu quả, xin vui lòng gọi:

- **PCH Phòng 1B** theo số 6456 3630 hoặc
- **Đường dây Thông tin Thuốc Khoa Dược PCH** theo số 6456 0190 (bấm lựa chọn 1), thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ làm việc hành chính.



Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

Tài liệu này có thể có ở những định dạng khác
khi được yêu cầu cho người khuyết tật.

Dịch vụ Sức khỏe Trẻ em và Thiếu niên

15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009.

Điện thoại: (08) 6456 2222

Được soạn thảo bởi: Đơn vị Phỏng/Bỏng/Công tác Xã hội

Tham chiếu: 581.9 © CAHS 2021

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ấn bản này là vì mục đích thông tin và giáo dục tổng quát. Hãy liên lạc với nhân viên y tế có chuyên môn nếu cần bất kỳ lời khuyên y tế nào.

©Tiểu bang Tây Úc, Dịch vụ Sức khỏe Trẻ em và Thiếu niên.