


Kế hoạch điều trị cấp cứu động kinh

Động kinh co giật = Co giật không kiểm soát tay chân và thân thể kèm thay đổi mức độ tri giác.

1. Lưu ý thời gian khởi phát, thời lượng và các đặc điểm của động kinh

2. Thực hiện cấp cứu

- Hãy giữ bình tĩnh
- Loại bỏ những vật có thể gây tổn hại và không đút ngón tay/vật dụng vào trong miệng của trẻ.
- Đừng cố gắng kìm giữ những cử động của trẻ
- Nếu trẻ ở trên mặt đất, lót vật mềm dưới đầu trẻ và nới lỏng bất kỳ thứ gì chẹt xung quanh cổ của trẻ
- Nếu trẻ đang nằm, sau khi động kinh ngừng, hãy lăn trẻ qua nằm nghiêng (tức là tư thế hồi phục), nếu có thể làm được thế, cho đến khi trẻ sẵn sàng để tự ngồi dậy hoặc có người đến giúp
- Hãy ở lại với trẻ và tiếp tục theo dõi hô hấp và màu sắc của trẻ đến khi có sự trợ giúp hoặc trẻ bình phục.
- Hãy cố gắng giữ sự riêng tư và để những người khác ở xa



3. Hãy gọi 000 xin xe cứu thương ngay lập tức

- Nếu trẻ có khó thở hoặc trở nên tím tái (tím tái xung quanh mặt/môi) trong hoặc sau cơn động kinh
- Trẻ bị thương hoặc tổn hại
- Động kinh xảy ra dưới nước



4. Nếu động kinh co giật tiếp tục hơn.....phút, hãy sử dụng midazolam được kê toa:

Đường dùng:	☐ Niêm mạc ☐ Trong mũi
Liều lượng Midazolam	 mg (..... giọt / mL / ống thuốc)
Hướng dẫn:	
Gọi xe cứu thương	☐ Trước / vào lúc cho midazolam ☐ Nếu động kinh không dừng trong vòng phút sau khi cho midazolam ☐ Khác:.....
Liều midazolam thứ hai	☐ Không được kê toa ☐ Cho mg (..... giọt / ống thuốc) nếu động kinh không ngừng phút sau khi cho liều midazolam thứ nhất
Gọi xe cứu thương:	☐ Tại thời điểm cho liều midazolam thứ 2 ☐ Nếu động kinh tiếp tục phút sau khi cho liều midazolam thứ hai
Hướng dẫn:	
Liều tối đa trong 24 giờ	

Những ống thuốc nhựa chứa midazolam **5 mg trong 1 ml** được ưa chuộng hơn (1 ml tương đương 20 giọt). Những ống midazolam được ghi nhãn 'dùng để tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch chậm', tuy nhiên, có thể được dùng bằng đường niêm mạc má và trong mũi).

Midazolam niêm mạc má: có thể cho thuốc bằng cách ép các giọt từ ống thuốc trực tiếp vào trong khoang niêm mạc má (giữa nướu/lợi và má).

Midazolam trong mũi có thể cho thuốc bằng cách sử dụng dụng cụ 'phun sương' theo như hướng dẫn của y tá, bác sĩ hoặc dược sĩ của con quý vị.

Tên bệnh nhân:

Ngày sinh:

Chữ ký của bác sĩ:

Viết tên in hoa:

Ngày tháng:



Government of **Western Australia**
Child and Adolescent Health Service

Dịch vụ Sức khỏe Trẻ em và Thiếu niên
15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009
Điện thoại: (08) 6456 4327
Được soạn thảo bởi: Khoa Thần kinh
Tham chiếu: 1096.9 © CAHS 2023



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ấn bản này là vì mục đích thông tin và giáo dục tổng quát. Hãy liên lạc với nhân viên y tế có chuyên môn nếu cần bất kỳ lời khuyên y tế nào.
© Tiểu bang Tây Úc, Dịch vụ Sức khỏe Trẻ em và Thiếu niên
Dịch vụ Sức khỏe Trẻ em và Thiếu niên

Tài liệu này có thể có ở những định dạng khác khi được yêu cầu cho người khuyết tật.

Perth Children's Hospital and Neonatology | Community Health | Mental Health

